

# Química Computacional (2022-2023)

## Trabalho Prático 2a: Revisão Matemática

Aplicações simples: vetores, matrizes e transformações unitárias (ortogonais)

- 1) Considere os seguintes vetores:  $\vec{a} = (1.1 ; 0 ; 2.3)$   $\vec{b} = (1 ; 1 ; 2.5)$   $\vec{c} = (0 ; 2.5 ; -1)$ .

Calcule:

- Os módulos de  $\vec{a}$ ,  $\vec{b}$  e  $\vec{c}$ ;
- O produto interno dos vetores  $\vec{a} \cdot \vec{b}$ ,  $\vec{a} \cdot \vec{c}$ , e  $\vec{b} \cdot \vec{c}$ ;
- Verifique quais destes vetores são ortogonais entre si.

- 2) Considere as seguintes matrizes:

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 2 & 3 \end{pmatrix} \quad \mathbf{B} = \begin{pmatrix} 4 & 1 \\ 1 & 3 \end{pmatrix}$$

Calcule o produto matricial  $\mathbf{C} = \mathbf{AB}$ .

- 3) Considere as seguintes matrizes:

$$\mathbf{U} = \begin{pmatrix} \cos \theta & \sin \theta \\ \sin \theta & -\cos \theta \end{pmatrix} \quad \mathbf{O} = \begin{pmatrix} O_{11} & O_{12} \\ O_{12} & O_{22} \end{pmatrix}$$

- Verifique que  $\mathbf{U}^\dagger \mathbf{U} = \mathbf{I} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ , ou seja, que  $\mathbf{U}$  é unitária.

- Calcule a seguinte transformação unitária:  $\mathbf{\Omega} = \mathbf{U}^\dagger \mathbf{O} \mathbf{U}$ .

- Verifique que, para que  $\mathbf{\Omega}$  seja diagonal, o ângulo  $\theta$  deve ser dado por:

$$\theta = \frac{1}{2} \tan^{-1} \frac{2O_{12}}{O_{11} - O_{22}}$$

- Verifique que os valores próprios  $\omega_1$  e  $\omega_2$  de  $\mathbf{O}$ , obtidos através da transformação unitária 3b, ou seja:

$$\mathbf{U}^\dagger \mathbf{O} \mathbf{U} = \begin{pmatrix} \cos \theta & \sin \theta \\ \sin \theta & -\cos \theta \end{pmatrix} \begin{pmatrix} O_{11} & O_{12} \\ O_{12} & O_{22} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \cos \theta & \sin \theta \\ \sin \theta & -\cos \theta \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \omega_1 & 0 \\ 0 & \omega_2 \end{pmatrix}$$

são dados por:

$$\omega_1 = O_{11} \cos^2 \theta + O_{22} \sin^2 \theta + O_{12} \sin(2\theta)$$

$$\omega_2 = O_{11} \operatorname{sen}^2 \theta + O_{22} \cos^2 \theta - O_{12} \operatorname{sen}(2\theta)$$

4) Do exercício anterior temos que os vetores próprios de  $\mathbf{O}$  são dados por:

$$\begin{pmatrix} c_1^1 \\ c_2^1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \cos \theta \\ \operatorname{sen} \theta \end{pmatrix} \text{ e } \begin{pmatrix} c_1^2 \\ c_2^2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \operatorname{sen} \theta \\ -\cos \theta \end{pmatrix}$$

ou seja

$$\begin{pmatrix} O_{11} & O_{12} \\ O_{12} & O_{22} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} c_1^1 \\ c_2^1 \end{pmatrix} = \omega_1 \begin{pmatrix} c_1^1 \\ c_2^1 \end{pmatrix} \text{ e } \begin{pmatrix} O_{11} & O_{12} \\ O_{12} & O_{22} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} c_1^2 \\ c_2^2 \end{pmatrix} = \omega_2 \begin{pmatrix} c_1^2 \\ c_2^2 \end{pmatrix} \quad (\mathbf{I})$$

Considere a matriz:

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 3 & 1 \\ 1 & 3 \end{pmatrix}$$

- a) Calcule, utilizando o método das transformações unitárias, os valores e vetores próprios de  $\mathbf{A}$ .
- b) Verifique a equação de valores próprios (**I**) para a matriz  $\mathbf{A}$ .

### Relações úteis:

$$\begin{aligned} \operatorname{sen}^2 \theta + \cos^2 \theta &= 1 & \cos(2\theta) &= \cos^2 \theta - \operatorname{sen}^2 \theta & \operatorname{sen}(2\theta) &= 2 \cdot \cos \theta \cdot \operatorname{sen} \theta \\ \tan \theta &= \frac{\operatorname{sen} \theta}{\cos \theta} & \cos\left(\frac{\pi}{4}\right) &= \operatorname{sen}\left(\frac{\pi}{4}\right) & \frac{1}{\sqrt{2}} & \tan^{-1}(+\infty) = \frac{\pi}{2} \end{aligned}$$