

Mecânica Analítica

Série 5: Teoria de Hamilton-Jacobi

1. [1] Mostre que a função

$$S = \frac{m\omega}{2} (q^2 + \alpha^2) \cot \omega t - m\omega q \alpha \csc \omega t \quad , \quad (1)$$

é uma solução da equação de Hamilton-Jacobi para a função principal de Hamilton para o oscilador harmónico linear com

$$H = \frac{1}{2m} (p^2 + m^2 \omega^2 q^2) \quad . \quad (2)$$

Mostre que esta equação gera a solução correta para o movimento do oscilador harmónico.

2. [2] Considere o movimento unidimensional de uma partícula de massa m sujeita a uma força uniforme αt que aumenta linearmente no tempo.

- (a) Determine o Hamiltoniano do sistema.
- (b) Qual a correspondente equação de Hamilton-Jacobi?
- (c) Mostre que a função principal de Hamilton S pode-se escrever na forma:

$$S = \frac{1}{2} \alpha t^2 x + \beta x - \phi(t) \quad (3)$$

onde β é uma constante e ϕ uma função apenas do tempo.

- (d) Resolva a correspondente equação para ϕ . Consequentemente, determine a posição e o momento como funções do tempo.
3. [2] Considere uma pérola de massa m que se pode movimentar num aro de raio R . O aro está animado de um movimento de rotação uniforme (velocidade angular ω) em torno de um eixo vertical. A aceleração da gravidade é uniforme g e vertical; designe por θ o ângulo que a posição da partícula faz em relação ao eixo vertical.
- (a) Obtenha o momento generalizado e o Hamiltoniano expresso em termos de p_θ e θ .
 - (b) Use o método de Hamilton-Jacobi para construir um integral explícito para a lei horária $\theta(t)$.

4. [2] Considere um sistema físico descrito pelas seguintes energias cinética (T) e potencial (V):

$$T = \frac{1}{2} (x^2 + y^2) (\dot{x}^2 + \dot{y}^2) \quad (4)$$

$$V = \frac{1}{x^2 + y^2} \quad . \quad (5)$$

- (a) Qual a equação de Hamilton-Jacobi para este sistema?
 - (b) Separando variáveis, encontre a função principal de Hamilton e, consequentemente, deduza o movimento dinâmico do sistema (não é necessário calcular explicitamente integrais simples).
5. [1] Resolva o problema do movimento de um projétil, usando o método de Hamilton-Jacobi. Escreva as equações do movimento e a dependência das coordenadas no tempo, assumindo que o projétil é lançado no instante $t = 0$ da origem do referencial, com velocidade de módulo v_0 , fazendo um ângulo α com a horizontal.

6. Considere uma partícula de massa m num potencial central.

- (a) Escreva o Hamiltoniano do problema em coordenadas esféricas.
- (b) Mostre que, se a função característica de Hamilton é completamente separável, então a equação de Hamilton-Jacobi pode ser reduzida a

$$\left(\frac{\partial W_r}{\partial r}\right)^2 + \frac{\alpha_\phi^2}{r^2} = 2m [E - V(r)] \quad , \quad (6)$$

onde E é a energia do sistema, $W = W_r(r) + W_\theta(\theta) + W_\phi(\phi)$ a função característica de Hamilton e α_ϕ uma constante. Determine α_ϕ em função dos momentos p_ϕ e p_θ .

7. [1] Uma partícula de massa m move-se numa dimensão sujeita a um potencial $V(x) = k|x|$, onde k é constante. Usando as variáveis ação-ângulo, determine o período do movimento em função da energia.

8. Uma partícula de massa m move-se em uma dimensão, sujeita a um potencial,

$$V = \alpha x^2 \quad . \quad (7)$$

- (a) Obtenha uma expressão integral para a função característica de Hamilton.
- (b) Em que condições podem as variáveis de ação-ângulo serem consideradas?
- (c) Assumindo que as variáveis de ação-ângulo podem ser consideradas, determine a frequência do movimento.
- (d) Verifique o resultado comparando com a solução das equações do movimento.

Referências

- [1] GOLDSTEIN, H., POOL, C., AND SAFKO, J. *Classical Mechanics*. Addison-Wesley Publishing Company, Boston, MA, USA, 2002.
- [2] LAGE, E. J. S. *Mecânica Avançada*. Universidade do Porto, Porto, Portugal, 2015.